

CRESCIMENTO COMPENSATÓRIO EM JUVENIS DE TAMBAQUI (*COLOSSOMA MACROPOMUM*) SUBMETIDOS À CICLOS DE JEJUM E REALIMENTAÇÃO

I Workshop Nacional sobre Tecnologia de Bioflocos na Amazônia, 1^a edição, de 21/06/2021 a 25/06/2021
ISBN dos Anais: 978-65-89908-39-5

GOMES; África Silva¹, LÔBO; Maria Vitória Marialva da Silva², SILVA; Allana Feitosa da³, PAZ; Deborah Jacob Freire da⁴, COSTA; Priscila Miller⁵, GIMBO; Rodrigo Yukihiro⁶

RESUMO

Jejum e realimentação como estratégia para alcançar o crescimento compensatório mostra-se interessante no cenário atual da aquicultura, uma vez que a alimentação pode ser responsável por mais de 70% do custo da produção. Assim o objetivo do estudo foi verificar o crescimento compensatório em juvenis de tambaqui (*Colossoma macropomum*) submetidos a ciclos curtos de jejum e realimentação. 108 juvenis de tambaqui (29,53 g \pm 1,31) foram, igualmente distribuídos em 12 tanques de polietileno com capacidade de 200 L, com recirculação de água, aeração constante e alimentados até a saciedade aparente para avaliar três ciclos de jejum e realimentação, sendo eles: peixes submetidos ao jejum de dois dias e realimentados por dois dias (J2R2); jejum de dois dias e realimentados por três dias (J2R3) e jejum de dois dias e realimentados por quatro dias (J2R4), além de um grupo controle, cujos peixes foram diariamente alimentados. O experimento teve duração de 60 dias, e após este período todos os peixes foram anestesiados e submetidos à biometria para obter os dados de ganho em peso (GP), taxa de crescimento específico (TCE) e conversão alimentar. Os dados foram testados quanto a normalidade dos erros e homogeneidade das variâncias e posteriormente, submetidos à ANOVA, seguido pelo teste de Tukey, se significativo ($P<0,05$). Durante o experimento não houve mortalidade e os resultados de GP e TCE dos peixes do tratamento J2R4 foi semelhante ($P<0,05$) ao grupo controle. J2R4 também apresentou menor conversão alimentar em relação aos demais tratamentos. Baseado nos resultados obtidos, é possível concluir que o ciclo J2R4 pode ser utilizado para alcançar o crescimento compensatório de juvenis de tambaqui, além de resultar em melhor aproveitamento da dieta.

PALAVRAS-CHAVE: Tambaqui, Crescimento compensatório, metabolismo

¹ Universidade Nilton Lins, adriasilvagomes@gmail.com

² Universidade Nilton Lins, mavimslobo@gmail.com

³ Centro de Aquicultura da Unesp , allanafeitoza@gmail.com

⁴ Universidade Nilton Lins, debjacobs@hotmail.com

⁵ Universidade Nilton Lins, priscilamiller0@gmail.com

⁶ Universidade Nilton Lins, rodrigo.gimbo@uniniltonlins.edu.br