

PREVALÊNCIA E FATORES ASSOCIADOS A TRANSTORNOS DEPRESSIVOS EM PACIENTES SUBMETIDOS À DIÁLISE: UM ESTUDO NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO

18º Congresso de Iniciação Científica, 18ª edição, de 02/05/2025 a 03/05/2025
ISBN dos Anais: 978-65-5465-152-3

AZEVEDO; Wellington Marcos Vital de¹, SILVA; Caio de Oliveira da Silva², PÓVOA GOMES; Luiz Othávio huebra³, MENEZES; emanuel campos menezes⁴, JR; Luiz dos Santos Freitas Mattos⁵, LEITE; Renan Thomazini Leite⁶

RESUMO

A depressão é uma condição crônica e debilitante, com alta prevalência em pacientes submetidos à terapia renal substitutiva, como a diálise. Esses pacientes enfrentam múltiplos fatores que contribuem para o surgimento de sintomas depressivos, como o impacto emocional da doença, alterações metabólicas e limitações impostas pelo tratamento. Tais transtornos estão associados a pior adesão ao tratamento e aumento da mortalidade, destacando a importância de estratégias de manejo efetivas. Ferramentas como a Escala de Depressão de Hamilton, Inventário de Depressão de Beck e o software LIWC podem ajudar a identificar e compreender a relação entre sintomas depressivos e fatores clínicos, proporcionando dados relevantes para intervenções direcionadas. **Objetivo Geral:** Avaliar a prevalência e os fatores associados aos transtornos depressivos em pacientes submetidos à diálise no Hospital São Vicente de Paulo, Bom Jesus, RJ. **Métodos:** O estudo contará com 50 pacientes em terapia renal substitutiva, avaliados através de questionários padronizados, como o GRID-HAM-D-17 e o BDI, além da análise semântica pelo software LIWC. A coleta de dados incluirá informações sociodemográficas, clínicas e psicológicas. Serão analisados os níveis de depressão e ansiedade, considerando variáveis como idade, sexo, tempo de tratamento dialítico e presença de comorbidades. As análises estatísticas serão conduzidas utilizando o software SPSS, aplicando testes paramétricos e não paramétricos conforme a distribuição dos dados. **Resultados Esperados:** Espera-se identificar uma alta prevalência de sintomas depressivos em pacientes em diálise, bem como associações significativas entre níveis de depressão e fatores como idade, sexo e comorbidades. Além disso, a análise semântica por meio do LIWC deve revelar padrões emocionais que complementem os achados quantitativos, fornecendo uma visão abrangente sobre o impacto psicológico da diálise nessa população. **Conclusão:** Os resultados podem subsidiar a implementação de estratégias terapêuticas e psicossociais direcionadas, contribuindo para a melhoria do bem-estar psicológico e dos desfechos clínicos de pacientes submetidos à diálise.

PALAVRAS-CHAVE: Palavras-chave: Depressão, diálise, transtornos depressivos, comorbidades, qualidade de vida, Escala de Hamilton, Inventário de Beck, LIWC

¹ Uniredentor, wmvazevedo@gmail.com

² Uniredentor, caio123nk@gmail.com

³ Uniredentor, luizothaviopovoa@gmail.com

⁴ Uniredentor, emanuelcampos14@hotmail.com

⁵ Uniredentor, luizmattosjr82@gmail.com

⁶ Uniredentor, Renanthomazinileite@gmail.com

¹ Uniredentor, wmvazevedo@gmail.com
² Uniredentor, caio123nk@gmail.com
³ Uniredentor, luizothaviopovoa@gmail.com
⁴ Uniredentor, emanuelcampos14@hotmail.com
⁵ Uniredentor, luizmattosjr82@gmail.com
⁶ Uniredentor, Renanthomazinileite@gmail.com