

# MASTECTOMIA COM RECONSTRUÇÃO IMEDIATA EM UM HOSPITAL DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL – UMA ANALISE EPIDEMIOLOGA E HISTOPATOLOGICA.

Congresso Online Geral de Ginecologia e Obstetrícia, 1<sup>a</sup> edição, de 06/08/2021 a 07/08/2021  
ISBN dos Anais: 978-65-89908-71-5

GOMES; MARIANA FERREIRA XAVIER <sup>1</sup>, GUNDIM; DANIEL FERREIRA <sup>2</sup>, ALEXANRE; PEDRO RUBEM FRAZAO <sup>3</sup>, GUNDIM; YOHANA FERREIRA <sup>4</sup>, GUNDIM; FERNANDA FERREIRA <sup>5</sup>, BELLUCO; ROSANA ZABULON FEIJO <sup>6</sup>

## RESUMO

O câncer de mama é a afecção que mais causa mortes na população feminina. O tratamento do câncer de mama pode condicionar uma desfiguração significativa com graves repercussões na qualidade de vida da mulher. Seu tratamento é principalmente cirúrgico, o que causa grande impacto psicossocial na mulher. Para diminuir esse abalo, a cirurgia reconstrutiva promove estado de bem-estar e reverte muitas das consequências psicológicas e emocionais associadas à mastectomia. **Objetivo:** Avaliar o perfil epidemiológico e histológico das pacientes submetidas à mastectomia com reconstrução imediata no Hospital Regional da Asa Norte. **Método:** Estudo retrospectivo, transversal, descritivo e observacional realizado através da análise de prontuários eletrônicos das pacientes submetidas à mastectomia com reconstrução mamária imediata no HRAN, no período entre março de 2013 a março de 2019. **Resultados:** De 133 mastectomias, 32 foram com reconstrução imediata. Os demais parâmetros avaliados se mostraram condizentes com os encontrados na literatura no que diz respeito à idade, estadiamento, anatomapatológico, imunohistoquímica e técnicas usadas. **Conclusão:** O perfil epidemiológico, anatomapatológico e imunohistoquímico das pacientes submetidas à mastectomia com reconstrução imediata no HRAN são: procedente de outros estados, com uma idade média de 46 anos, casadas ou solteiras, com em média 1,87 filhos, com acometimento da mama esquerda, mamografia com BI-RADS 0 ou IV, ecografia com BI-RADS V, no estádio II, anatomapatológico compatível com Carcinoma DuctalInfiltrante e imunohistoquímica Luminal B. A mastectomia simples é a técnica mais usada e para a reconstrução imediata a principal técnica é a com o uso de próteses expansoras.

**PALAVRAS-CHAVE:** EPIDEMIOLOGIA, HISTOLOGIA, MASTECTOMIA, RECONSTRUCAO MAMARIA

<sup>1</sup> HOSPITAL REGIONAL DA ASA NORTE, marianafxg@hotmail.com

<sup>2</sup> UNICEPLAC, danielgundim@gmail.com

<sup>3</sup> UNICEPLAC, pedrofrazao94@gmail.com

<sup>4</sup> UNITPAC, yohana\_gundim@hotmail.com

<sup>5</sup> UNIRV, fernandagundim@academico.unirv.edu.br

<sup>6</sup> HOSPITAL REGIONAL DA ASA NORTE, rbellucco@icloud.com