

FATORES DE RISCO ASSOCIADOS A PARALISIAS DECORRENTES DE LESÕES DO PLEXO BRAQUIAL EM NEONATOS

Congresso On-line de Neurocirurgia e Neurologia, 1^a edição, de 14/12/2020 a 18/12/2020
ISBN dos Anais: 978-65-86861-22-8

CARVALHO; Ana Clara Silva¹, NETO; Ernann Tenório de Albuquerque², BARROS; Luanni Souto de Albuquerque³, OLIVEIRA; Angélica Camilo de⁴, OLIVEIRA; Cynthia Camilo⁵

RESUMO

Introdução: A lesão do plexo braquial em neonatos pode resultar em fraqueza ou paralisia dos membros superiores e é resultante do alongamento dos nervos no decorrer do parto ou após o nascimento. As paralisias causadas pelas lesões do plexo trazem malefícios à qualidade de vida dos indivíduos acometidos, repercutindo nos âmbitos físico, psicológico e socioeconômico dos pacientes e das suas respectivas famílias. Nesse contexto, torna-se fundamental o reconhecimento precoce dos fatores predisponentes das paralisias resultantes de lesões do plexo braquial, para uma intervenção propedêutica mais efetiva e melhor gerenciamento dos sintomas. **Objetivo:** Avaliar os principais fatores de risco associados a paralisias decorrentes de lesões do plexo braquial em neonatos. **Material & Métodos:** Trata-se de uma revisão integrativa com base em informações disponibilizadas nas bases de dados Medline (via Pubmed), Lilacs (via BVS), Scielo e Cochrane Library com a estratégia de busca “brachial plexus injuries AND (Obstetric trauma OR neonatal)” no período de julho de 2020, sem restrição de idioma e com filtro de 5 anos. Incluíram-se estudos observacionais, analíticos ou descritivos, relacionados a paralías decorrentes de lesões do plexo braquial e foram excluídos estudos com animais e revisões de literatura. **Resultados e Discussão:** 284 artigos foram encontrados com a estratégia de busca, dos quais 114 estudos foram selecionados após a leitura do título, 28 foram considerados relevantes após a leitura dos resumos e 9 artigos foram incluídos nesta revisão. Os principais fatores de risco abordados para o desenvolvimento de paralisias resultantes de lesões do plexo braquial foram macrossomia fetal, distocia do ombro, diabetes materna, uso de fórceps e hipotonía. **Conclusão:** Os fatores de risco associados às paralisias, como a macrossomia fetal e a diabetes materna, podem ser facilmente identificados no período gestacional e devem ser monitorados, a fim de que se garanta a segurança do neonato durante o nascimento, sobretudo em casos de parto normal, além de evitar o uso de fórceps.

PALAVRAS-CHAVE: Fatores de risco. Paralisias. Plexo braquial.

¹ Centro Universitário Cesmac, anaclara.sc@outlook.com

² Centro Universitário Cesmac, ernannneto@hotmail.com

³ Centro Universitário Cesmac, luannisouto@gmail.com

⁴ Centro Universitário Cesmac, angelicacamilo@hotmail.com

⁵ Centro Universitário Serra dos Órgãos, cynthiacco@hotmail.com