

AVALIAÇÃO DO USO DE PHOSPORUS NA PREVENÇÃO DE SINTOMAS GRAVES DE COVID ENTRE SERVIDORES DA SAÚDE COMPARADO COM GRUPO CONTROLE EM UM HOSPITAL REFERÊNCIA NO MANEJO DA PANDEMIA EM MINAS GERAIS

35 Congresso Brasileiro de Homeopatia, 1^a edição, de 02/06/2021 a 06/06/2021
ISBN dos Anais: 978-65-89908-31-9

LUCAS; Jesiane Pereira ¹, SILVA; Eumara Barbosa da²

RESUMO

Justificativa: diante da gravidade da pandemia por COVID e de usos de homeopatia em outros momentos epidêmicos mundiais com resultados importantes, propôs esse estudo. **Objetivo:** avaliar a ocorrência de swab nasal positivo entre pessoas que usaram Phosphorus em comparação ao grupo controle durante o período de maio a novembro de 2020 assim como a ocorrência de sintomas graves de COVID entre esses grupos. **Método:** a pesquisa foi realizada em um hospital referência estadual (MG) em COVID no período de maio a setembro de 2020. Com o intuito de prevenção (primária e secundária), foram fornecidos aos servidores 1 glóbulo de Phosphorus nos meses de maio, julho e setembro nas apresentações 30CH, 33CH, 36CH respectivamente. Os tratamentos foram distribuídos nos setores de enfermaria, CTI e no ambulatório. Foram distribuídas 572 doses para 325 trabalhadores (assistência, setor administrativo, limpeza). Foram coletados resultados de SWAB dos funcionários da unidade que consultaram no ambulatório de COVID no período de estudo. O exame de Swab, quando negativo, era repetido. Compararam-se o grupo homeopatia (fez uso de medicação (n: 325) e controle (sem uso, n: 475) quanto à Incidência do teste swab+ e gravidade de sintomas. Consideraram-se graves pessoas com mais de quatro sintomas ou que apresentassem desconforto respiratório. **Resultados:** No ambulatório de COVID, 140 trabalhadores positivaram, dos quais 110 (80%) não havia usado nem uma dose de homeopatia. A maioria era mulheres, menores de 60 anos. A ocorrência do teste positivo entre os que usaram homeopatia (n.325) foi 9% (n.30) enquanto entre os que não usaram (n.475), 17% (80). Quanto à gravidade dos sintomas, a ocorrência foi maior nos que não usaram homeopatia. Os resultados foram 3,7% e 8,4% respectivamente nos grupos homeopatia (n: 325) e grupo controle (n: 475). Entre os que apresentaram swab+ (n.140), 52 pessoas tiveram sintomas graves, 40 (77%) não haviam usado homeopatia. **Conclusão do trabalho:** com esses dados, observou-se duas vezes menos swab+ em pessoas que usaram homeopatia nesse estudo. Entre os que apresentaram gravidade de sintomas, A gravidade dos sintomas foi menor em pessoas que usaram phosphorus no período em questão. Para a extração de resultados para o restante da população, exige-se a realização de outros estudos e maiores detalhamentos estatísticos.

PALAVRAS-CHAVE: SAÚDE PÚBLICA

¹ 00, 00@00
² 00, 00@00