

LATICÍNIOS FERMENTADOS E/OU SUPLEMENTADOS COM PROBIÓTICOS NA PREVENÇÃO E NO TRATAMENTO ADJUVANTE DE PSICOPATOLOGIAS: UMA REVISÃO DE LITERATURA

II Congresso Online Acadêmico de Nutrição, 1ª edição, de 10/04/2023 a 12/04/2023
ISBN dos Anais: 978-65-5465-027-4
DOI: 10.54265/BKLI2325

CORDEIRO; Arthur Gabriel de Campos¹, CARMO; Mariana Araújo Vieira do²

RESUMO

Nutrição e alimentos funcionais Objetivo: Compendiar estudos que corroborem para a utilização de laticínios fermentados e não fermentados, e/ou suplementados com probióticos na prevenção e no tratamento adjuvante nas psicopatologias em humanos. Métodos: Foi realizada uma revisão integrativa a partir do levantamento literário livre nas plataformas PubMed e SciELO com as palavras chaves, psicobióticos, psicopatologias, comidas fermentadas e eixo-intestino-cérebro e seus equivalentes em inglês. Para inclusão dos estudos foi utilizado o critério de avaliação PICO. Resultados: Após a busca foram selecionados 6 artigos, entre estes 5 randomizados, duplo-cego com placebo e 1 estudo observacional. O tempo de duração dos estudos variou , em média, entre 5 a 12 semanas, tendo como meio de oferta: iogurte suplementado ou não com probióticos, leite fermentado e leite cru. As espécies de microrganismos utilizados foram *Lactobacillus* e *Bifidobacterium* em quantidades entre 1×10^7 a 1×10^{10} UFC/g. Para avaliação de parâmetros estressores, depressivos e ansiosos foram utilizadas escalas psicométricas e marcadores bioquímicos como cortisol, células natural killers, ACTH, IL-6 e TNF-alfa. A utilização dos laticínios, sobretudo aqueles suplementados com probióticos, apresentou efeito benéfico tanto em sintomas somáticos relacionados ao estresse, ansiedade e depressão, quanto em parâmetros bioquímicos e relativos a qualidade da microbiota intestinal. Cepas de *Lactobacillus gasseri* SBT2055 ($1,5 \times 10^9$ UFC/g) e *Bifidobacterium longum* SBT2928 ($1,5 \times 10^9$ UFC/g) consumidas através de iogurte suplementado apresentaram melhora subjetiva de sintomas estressores via escala GQH-28 (de 1.6 ± 1.7 para 1.2 ± 1.4 , $P <0.01$) não em relação ao grupo placebo mas em relação a pontuação do grupo intervenção anterior a suplementação. Ainda tais cepas foram capazes de diminuir marcadores bioquímicos do estresse como ACTH (placebo: 0.61 ± 6.02 pg/mL, teste: -1.77 ± 6.61 pg/mL) e cortisol (placebo: 0.90 ± 2.54 µg/dL; teste: 0.01 ± 2.81 µg/dL) assim como melhora do sistema imune por maior ativação de células N-killers. A utilização do leite cru expressou melhora significativa no incremento de *Lactobacilli* ($p= 0.0003728$; $q = 0.0498$) e *Lactococcus* ($p =0.01$; $q = 0.106$) e maior produção dos AGCC de cadeia curta propionato e valerato. O leite fermentado contendo *Lactobacillus casei* cepa Shirota com 1×10^9 UFC/mL foi capaz aumentar o nível fecal de serotonina ($P <0.05$) indicando intervenção positiva no metabolismo do triptofano, capaz de otimizar a produção serotoninérgica após períodos estressores. Ainda cepas de *Lacticaseibacillus paracasei* cepa Shirota contendo 10^8 UFC/mL, administradas por leite fermentado diminuíram os marcadores inflamatórios IL-6 e TNF-alfa ($P <0.05$) e melhora na qualidade da microbiota intestinal por aumento das espécies *Adlercreutzia*, *Megasphaera* e *Veillonella*. Conclusão: A utilização de laticínios fermentados e/ou suplementados, apresentou efeito benéfico na prevenção para o desenvolvimento de psicopatologias, por amenizar sintomas somáticos e parâmetros bioquímicos relativos ao estresse, ansiedade e depressão e pela modulação positiva da qualidade do microbioma intestinal. Ressalta-se a importância da utilização de tais alimentos na prevenção do surgimento de psicopatologias, já que na maioria dos estudos encontrados foram avaliados indivíduos saudáveis. Resumo apresentação oral

¹ Universidade Federal de Lavras, arthurcampp8@gmail.com

² Universidade Federal de Lavras, marianavieira06@hotmail.com

PALAVRAS-CHAVE: ansiedade, depressão, eixo intestino-cérebro, estresse, microbiota intestinal