

AVALIAÇÃO DA SEGURANÇA E EFICÁCIA DA PERINEOPLASTIA COMO TRATAMENTO DE VAGINA LARGA

II Congresso Médico Online de Ginecologia e Obstetrícia, 2ª edição, de 18/09/2023 a 20/09/2023

ISBN dos Anais: 978-65-5465-060-1

DOI: 10.54265/SADT1398

GOMES; Janine de Oliveira Alves Gomes¹, MARQUES; Emanuel Arislândio Costa², NEVES; Gelma Maria Jerônimo Vieira³, PINI; Izabella Gurgel do Amaral⁴, OLIVEIRA; Vivian Franciny Amaral⁵, FEITOSA; Ivan Brito⁶

RESUMO

INTRODUÇÃO: As alterações fisiológicas na vida da mulher como o parto, flutuações de peso e as alterações hormonais, devido ao envelhecimento e a menopausa podem alterar a frouxidão do canal vaginal, danificar o assoalho pélvico e desvitalizar a autonomia da mucosa do aparelho vaginal, sendo preciso intervenções cirúrgicas para melhorar a qualidade de vida de muitas mulheres. **OBJETIVO:** O objetivo deste estudo foi avaliar o uso da perineoplastia como tratamento de vagina larga, como também descrever sua eficácia e segurança. **METODOLOGIA:** Foi realizada uma revisão de literatura em banco de dados de revistas indexadas. A pesquisa foi realizada nas bases MEDLINE/PubMed, Scopus Latin Literatura Americana, logo utilizamos os seguintes descritores: wide vagina surgery and Vagin; wide vagina surgical treatment. O estudo seguiu as recomendações dos itens preferenciais de relatórios para revisões sistemáticas, que propuseram a perineoplastia, como cirurgia de escolha para a queixa de vagina larga. **RESULTADOS:** Foram encontrados 08 artigos, sendo inclusos 02 trabalhos. Como resultado, foi visto que das intercorrências pós operatórias, a dispareunia no intróito da vagina aparece em 10% das pacientes. A taxa de sucesso desse tipo de cirurgia foi de 87,9% durante o acompanhamento por 6 meses subsequentes à cirurgia. **CONCLUSÃO:** A perineoplastia como solução de vagina larga, decorrente da episiotomia e da sustentação pélvica deficiente têm prognósticos positivos, no que se refere a satisfação sexual da paciente e do parceiro, como também a diminuição da dispareunia a curto prazo. Logo, confere-se à perineoplastia o potencial de segurança e de eficácia. No entanto, mesmo em virtude da porcentagem de sucesso da perineoplastia, mais estudos são necessários para que a queixa de frouxidão vaginal seja validada como algo que interfere na qualidade de vida da mulher e assim, haja mais estudos voltados a essa queixa tão frequente nos consultórios médicos. Resumo - sem apresentação

PALAVRAS-CHAVE: Assoalho pélvico, Dispareunia, Episiotomia

¹ Centro Universitário São Lucas - Afya Educacional, jamoliveira16@gmail.com

² Centro Universitário São Lucas - Afya Educacional, eacm2305@gmail.com

³ Centro Universitário São Lucas - Afya Educacional, gelmaneves@gmail.com

⁴ Centro Universitário São Lucas - Afya Educacional, izabellapini@gmail.com

⁵ Centro Universitário São Lucas - Afya Educacional, vivianfrancinyamaraloliveira@gmail.com

⁶ Centro Universitário São Lucas - Afya Educacional, ivan.pvh.bio@gmail.com