

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE PACIENTES COM NEOPLASIA COLORRETAL ATENDIDOS EM UM HOSPITAL DE REFERÊNCIA NO VALE DO TAQUARI- RS

II InovaBiotec - Congresso de Inovação e Biotecnologia, 2^a edição, de 14/07/2021 a 17/07/2021
ISBN dos Anais: 978-65-89908-41-8

PAPPEN; Emelin ¹, LUCAS; Laiane Zanotelli Lucas², CONTINI; Verônica Contini³, HENRIQUES; João Antonio Pêgas Henriques⁴

RESUMO

Introdução: A neoplasia colorretal (CCR) é a terceira neoplasia que mais causa morte no mundo. Estima-se que até o ano de 2030 aproximadamente 1,5 milhão de pessoas irá receber o diagnóstico de serem portadores desse tipo de tumor.

Objetivo: O objetivo do presente trabalho foi determinar o perfil epidemiológico de pacientes com CCR atendidos pelo Hospital Bruno Born no Vale do Taquari – RS.

Metodologia: Os participantes eram pacientes pré-cirúrgicos com CCR moradores do Vale do Taquari, Rio Grande do Sul. As informações sobre o paciente e o tumor foram obtidas pela aplicação de um questionário e revisão de prontuário médico. Os dados obtidos foram analisados no software SPSS 27.0. **Resultados:** Após a assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido (COEP/Univates 29662920.6.0000.5310), vinte e seis pacientes responderam ao questionário, dos quais 57,7% era do sexo masculino. Do total da amostra 80,8% se autodenominaram brancos; 69,2% afirmaram serem casados/companheiro; 65,4 % residem na zona urbana de seus municípios de origem; 64,4% possuem primeiro grau incompleto; 96,2% ingere algum tipo de carne; 92,3% têm hábito de comer verduras/ frutas; 50 % não consomem bebidas alcoólicas; 84,6 % desenvolveram o costume de beber chimarrão; 76,9 % apresentam alguma comorbidade e 76,9% relataram não possuir histórico de CCR. Dezoito tumores apresentaram patologia moderadamente diferenciada e o sitio de tumor primário no reto foi identificado em quatorze tumores. **Conclusão:** Apesar do CCR ser mais incidente na população feminina no sul do Brasil, constatou-se nessa pesquisa que mais homens foram acometidos por essa neoplasia. A diabetes é a comorbidade associada ao desenvolvimento de CCR mas nessa trabalho a hipertensão foi a doença mais prevalente entre os pacientes.

PALAVRAS-CHAVE: Perfil epidemiológico, Câncer colorretal, Hipertensão, Sexo masculino

¹ Univates, emelin.pappen@universo.univates.br

² Univates, laiane.lucas@universo.univates

³ Univates, veronica.contini@univates.br

⁴ Univates, pegas.henriques@gmail.com