

ALMEIDA; MATHEUS PERETTI VIEIRA DE ¹, JUNIOR; VALDI GARBULHO JUNIOR², GARBELINI; VITOR BERCHOL ³, MIURA; TAMI MAIARA MENDONÇA⁴, SANTOS; ANA CLÁUDIA FERRARI DOS⁵

RESUMO

Introdução: No período gestacional, Meninas adolescentes (12 a 18 anos) e mulheres acima dos 30 anos, constituem os grupos com maior prevalência de complicações, sobretudo cardiovasculares. Eclampsia, hipertensão gestacional e pré – eclampsia estão entre as principais causas de óbitos durante a gestação.

Objetivos: Investigar a prevalência de mortalidade por transtornos hipertensivos na gestação no Estado de São Paulo, durante o período de 2009 a 2019, em comparação com os demais estados federativos, sejam casos suspeitos ou confirmados. **Materiais e Métodos:** Dados desse perfil epidemiológico foram extraídos do banco de dados públicos – DATASUS (dados acessados no dia 16 de agosto de 2023). Registros de mortalidade das pacientes diagnosticadas com hipertensão gestacional induzida pela gravidez com proteinúria significativa (CID-10:O14), no período de 2009 a 2019, em comparação aos demais Estados da Federação Brasileira. As informações apresentadas não vinculam ou implicam em danos e/ou consequências de caráter ético a terceiros, conforme prerrogativas da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP). Foram analisadas as seguintes variáveis: faixa etária, raça, escolaridade. Para análise estatística foi utilizado o programa JAMOVI 3º edição. Feita análise descritiva com números absolutos, aplicada a média de casos por ano e relacionada com as variáveis .

Resultados: Foi observado no Brasil entre os anos de 2009 a 2019 , 1300 casos de hipertensão gestacional induzida pela gravidez com proteinúria significativa (CID-10:O14) , a média de casos foi de 118,18 casos/ano. Os estados com maior prevalência foram : 1º Estado de São Paulo foi o mais prevalente com 187 casos (14,38%);2º - Minas Gerais com 134 casos (10,38%);3º- Rio De Janeiro com 111 casos (8,54%);4º- Bahia com 110 casos (8,46%). A faixa etária mais prevalente foi dos 30 aos 39 anos com 532 casos (40,32%), seguida pela idade de 20 a 29 anos com 522 casos (40,15%).A etnia mais prevalente foi a parda com 663 casos (50,96%),seguida pela etnia Branca 404 casos (31,07%).A escolaridade mais prevalente foi de 8 a 11 anos estudados com 483 casos (38,1%), seguida por 290 casos (22,30%) dos 20 a 29 anos . **Conclusão:** A partir dos dados coletados conclui-se que o estado com maior prevalência foi o de São Paulo. A idade mais prevalente foi de 30 a 39 anos, com escolaridade de 8 a 11 anos, da etnia parda.Por fim, esse estudo permitirá proporcionar um melhor direcionamento para o manejo de transtornos hipertensivos na gestação, através de um diagnóstico precoce e preciso, redução de custos nos tratamentos como também internações e verificação da efetividade das políticas de saúde para esses transtornos no Estado de São Paulo.

PALAVRAS-CHAVE: HIPERTENSÃO INDUZIDA PELA GRAVIDEZ, PROTEINÚRIA, EDEMA, ESCOLARIDADE, DISTRIBUIÇÃO POR ETNIA

¹ UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA, medmath17@gmail.com

² UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA, JUNIORGARBUHO@HOTMAIL.COM

³ UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA, VITORGARBELINI@HOTMAIL.COM

⁴ UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA, TAMI_MIURA@HOTMAIL.COM

⁵ UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA, ANAFERRARI@UNOESTE.BR