

DOENÇAS OCULARES ASSOCIADAS A PACIENTES PORTADORES DE DERMATITE ATÓPICA

IV Congresso Nacional Online de Clínica Médica, 4ª edição, de 06/11/2023 a 08/11/2023

ISBN dos Anais: 978-65-5465-069-4

DOI: 10.54265/KPOI5440

ALVES; Esther Rocha de Queiroz¹, OLIVEIRA; Laura Pires Soares de Oliveira², PORDEUS; Noeme Marina Coura Urtiga Pordeus³, SILVA; Dávila Ruama Sousa Silva⁴, FARIAS; Amanda Mirelly Correia Farias⁵, LINO; Maria Eduarda Nóbrega de Araújo⁶

RESUMO

INTRODUÇÃO: A dermatite atópica (DA) é uma doença inflamatória crônica da pele, que surge mais comumente entre a infância e a adolescência, e resulta em defeitos na barreira de proteção da pele, respostas imunológicas exacerbadas a antígenos microbianos e alérgenos. Esta condição tem como principais alterações o ressecamento da pele, eritema com edema, vesículas, e formação de lesões exsudativas e crostas na fase aguda e liquenificação na fase crônica. A dermatite associa-se comumente a outras condições atópicas, podendo haver também desdobramentos oculares. **OBJETIVO:** Este trabalho busca identificar as manifestações oculares mais comumente apresentadas nos pacientes portadores de dermatite atópica. **MÉTODOS:** Foi realizada uma revisão narrativa de literatura, utilizando os descritores DeCS/ MeSH: “Eye Manifestations” AND “Atopic Dermatitis”, utilizando as bases de dados LILACS e PUBMED. Foram selecionados artigos publicados nos últimos 10 anos (2013-2023), nas línguas inglês, português e espanhol, e disponíveis em texto completo. **RESULTADOS:** Inicialmente foram encontrados 35 artigos nas bases de dados. Após a aplicação dos filtros de seleção e da leitura crítica dos mesmos, foram incluídos 07 artigos nesta revisão de literatura. **DISCUSSÃO:** Pacientes portadores de dermatite atópica podem ter um maior risco de desenvolver diversas doenças oculares. Estudos estimam a frequência das manifestações oculares é de 25 a 50 %. O risco de envolvimento ocular aumenta a depender da idade, dos locais acometidos pela dermatite e da severidade da atopia. Os sintomas oculares mais comuns são: coceira, dor, vermelhidão, olho seco, deficiência visual e sensação de corpo estranho. As comorbidades mais comuns são a blefarite, a conjuntivite, os distúrbios do filme lacrimal, o ceratocone, a uveíte, a catarata subcapsular e o descolamento de retina. Achados perioculares comuns incluem as dobras de Dennie-Morgan e o escurecimento da pele periocular. **CONCLUSÃO:** Diante do exposto, evidenciou-se a correlação entre doenças oculares em pacientes portadores de dermatite atópica. Visto que a dermatite atópica, assim como diversas doenças dermatológicas, pode se manifestar inicialmente com achados oculares, é essencial a realização de consultas periódicas e exames oftalmológicos de rotina após o diagnóstico de DA. Tal conduta facilita a administração do tratamento adequado, reduzindo assim a chance de danos oculares permanentes no futuro. Há um bom prognóstico demonstrado após acompanhamento regular.

PALAVRAS-CHAVE: Manifestações oculares, Fatores de risco, Dermatite atópica

¹ Centro Universitário de João Pessoa (UNIPÊ), esther.rocha12b@gmail.com

² Faculdade de Medicina Nova Esperança (FAMENE), laurinhaoliveira1807@gmail.com

³ Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba (FCM), noemepordeus@gmail.com

⁴ Faculdade de Medicina Nova Esperança (FAMENE), davila.ruama20@gmail.com

⁵ Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba (FCM), Ammandafariascm@gmail.com

⁶ Centro Universitário Facisa (UNIFACISA), eduardanobregad@gmail.com