

MANAUS.; Bruna Guido do Nascimento Barros (Discente da FM-UFAM) Manaus, Amazonas, Brasil. Endereço: Rua Major Gabriel, 1651, Praça 14, Manaus. ¹, BRASIL.; Suzana Cássia Feltrin Alves (Discente da FMB-UNESP) Americana, São Paulo, Brasi. ², BRASIL.; Gerson Suguiyama Nakajima (Professor titular DCC-FMUFAM; Mestrado Profissional em Cirurgia - PPGRACI) Manaus, Amazonas, Brasil. ³, BRASIL.; Marconi Santos da Silva (Mestre pelo Programa de Mestrado Profissional em Cirurgia da FMUFAM) Manaus, Amazonas, Brasil. ⁴

RESUMO

Referências: TUPE, Christina Lynn ; PHAM, Thuy Van. **Anorectal Complaints in the Emergency Department**. Emergency Medicine Clinics of North America, v. 34, n. 2, p. 251–270, 2016. Disponível em: <<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0733862715001273?via%3Dihub>>. LOPES, Roberto Iglesias; SANT'ANNA, Alexandre Crippa; DIAS, André Roncon; *et al.* Abscesso perineal por ingestão acidental de palito de dente. Revista Brasileira de Coloproctologia, v. 26, n. 2, p. 193–196, 2006. Disponível em: <https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-98802006000200011>. KARATEKE, Faruk; DAS, Koray; OZYAZICI, Sefa; *et al.* **Anorectal Injuries due to Foreign Bodies: Case Reports and Review of the Management Options**. Case Reports in Surgery, v. 2013, p. 1–4, 2013. Disponível em: <<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23533918/>>.

Introdução: A realização de procedimentos para a retirada de objetos estranhos anorretais é uma das mais importantes emergências cirúrgicas, visto que as consequências dessa condição podem levar a complicações graves. Os distúrbios mais recorrentes estão associados à ingestão oral ou inserção anal de objetos, seja por acidente, seja voluntariamente para fins eróticos, ilícitos e podem causar lesões retais que afetam a vida, incluindo lacerações, sangramento, perfuração e obstrução. Mesmo que a coleta de dados a respeito da história do paciente se mostre um desafio, é necessário que a equipe de saúde delimite as condutas terapêuticas mais adequadas a serem tomadas.

Objetivos: Este trabalho visou elucidar a ocorrência de emergências anorretais envolvendo corpos estranhos. Foi realizado um levantamento dos últimos casos na literatura e avaliados a categoria do corpo estranho, incidência, métodos mais eficazes de diagnóstico, além dos tipos de tratamento e possíveis complicações.

Métodos: Foi realizada uma coleta de dados bibliográficos nas bases de dados SciELO, PubMed e Elsevier, com as palavras chave “corpo estranho”, “anorretal”, “emergências”, com os respectivos termos na língua inglesa “anorectal”, “foreign body” e “emergencies” na bases. Foram selecionados sete artigos que abordavam os principais aspectos envolvidos nas ocorrências de emergência que comprometem o ânus e o reto.

Resultados: Os desafios do tratamento dos casos de corpos estranhos anorretais retidos começam desde o diagnóstico. A principal dificuldade da avaliação é a coleta da história, visto que os pacientes não fornecem um histórico preciso por motivo de medo ou constrangimento. Pode afetar todas as idades, porém sobretudo em homens de meia idade. Na literatura, os tipos de corpo estranho variam muito, entretanto, há relatos com maior frequência de garrafas, velas, moedas, brinquedos e outros pequenos objetos. Dentre os artigos analisados, os principais métodos de diagnóstico são as radiografias, as ultrassonografias, além da tomografia computadorizada, que é o padrão ouro. O tratamento, majoritariamente, é conservador, porém em casos mais graves um cirurgião especialista é solicitado e complicações comuns são abscesso, perfuração e fissuras anais. **Conclusão:** Os casos de lesão anorretal por corpo estranho são bem reconhecidos, porém, pouco

¹ Universidade Federal do Amazonas, brunaguido1@gmail.com

² Universidade Estadual de São Paulo, suzana.feltrin@unesp.br

³ Universidade Federal do Amazonas, gsnakajima@gmail.com

⁴ Universidade Federal do Amazonas,

relatados. A maioria das queixas é benigna e pode ser diagnosticada através de avaliação cuidadosa, associando a história à exames físico e de imagem, como a radiografia de abdome, ultrassonografia e tomografia computadorizada, e posteriormente tratada com a conduta correta. Em casos de maior complexidade, um médico especialista deve ser consultado para assegurar um manejo e acompanhamento adequado.

PALAVRAS-CHAVE: Corpo Estranho, Emergências, Anorretal

¹ Universidade Federal do Amazonas , brunaguido1@gmail.com

² Universidade Estadual de São Paulo , suzana.feltrin@unesp.br

³ Universidade Federal do Amazonas , gsnakajima@gmail.com

⁴ Universidade Federal do Amazonas,