

FATORES RELACIONADOS À SOBREVIDA DE PACIENTES COM ADENOCARCINOMA GÁSTRICO SUBMETIDOS A TRATAMENTO CIRÚRGICO

XXXVII CONGRESSO CIENTÍFICO DOS ACADÉMICOS DE MEDICINA, 37^a edição, de 23/10/2023 a 26/10/2023
ISBN dos Anais: 978-65-5465-062-5

MATTAR; Beatriz Alvarez ¹, AGULHAM; Anelyse Pulner², JUNIOR; Carlos Roberto Naufel³

RESUMO

INTRODUÇÃO: O câncer gástrico é o quinto câncer mais comum, sendo a quarta principal causa de morte na oncologia, apesar da queda de sua incidência e da melhoria nos tratamentos disponíveis. Para estimar a sobrevida de pacientes com câncer gástrico, é essencial conhecer os fatores prognósticos mais relevantes.

OBJETIVOS: Investigar os fatores que impactam a sobrevida de pacientes com adenocarcinoma gástrico submetidos à gastrectomia. **MÉTODOS:** Estudo transversal, observacional e retrospectivo, com amostra de 82 pacientes com adenocarcinoma gástrico, submetidos a tratamento cirúrgico, no período de janeiro de 2018 a agosto de 2022. Foram analisados fatores epidemiológicos e prognósticos, como idade, sexo, localização do tumor no estômago, invasão linfonodal, extensão tumoral, invasão angiolinfática, diferenciação do tumor, presença de metástase à distância, margens cirúrgicas comprometidas e tempo de sobrevida dos pacientes. **RESULTADOS:** Dos 82 pacientes, 41,5% foi a óbito no período de seguimento, sendo o período máximo de acompanhamento de 56 meses. A mediana de tempo até o óbito foi de 22,4 meses, após a realização da gastrectomia. Idade avançada ($HR=2,76$; IC95%: 1,23-6,19; $p=0,014$), localização do tumor em fundo do gástrico ($HR= 2,77$; IC95%: 1,17-6,53; $p= 0,020$) e presença de metástase à distância ($HR= 2,13$; IC95%: 1,04-4,36; $p=0,039$) apresentaram um impacto negativo significativo na sobrevida, na análise multivariada. Por outro lado, os pacientes submetidos à quimioterapia adjuvante ($HR= 5,33$; IC95%: 2,02-14,1; $p=0,001$) ou à neo-adjuvante ($HR=3,36$; IC95%: 1,40-8,04; $p=0,006$) obtiveram um impacto positivo. **CONCLUSÃO:** O presente estudo demonstrou que a sobrevida de pacientes com adenocarcinoma gástrico é influenciada negativamente por idade avançada, localização do tumor em fundo do estômago e presença de metástase à distância. Em contraste com o impacto positivo da realização de quimioterapia adjuvante ou neoadjuvante.

PALAVRAS-CHAVE: Câncer gástrico, Gastrectomia, Análise de sobrevida

¹ FEMPAR, beatrizamattar@gmail.com

² FEMPAR, anelyseagulham@gmail.com

³ FEMPAR, carlosnaufel@hotmail.com